



องค์การบริหารส่วน
ตำบลท้ายสำเภา

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567



เฝ้าระวังการระบาดของโรคราสีชมพู



โรคราสีชมพู (เชื้อรา *Corticium salmonicolor*) ในกลุ่มไม้ผล สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศเย็นช่วงฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ เตือนกลุ่มผู้ที่ปลูกไม้ผลให้เตรียมความพร้อมรับมือโรคราสีชมพู โดยเส้นใยสีขาวของเชื้อราจะเจริญคลุมกิ่งหรือลำต้น ต่อมาเส้นใยเปลี่ยนเป็นสีครีมถึงชมพูอ่อนจะยึดแน่นกับกิ่งเมื่อเดือนดูพบเนื้อไม้เป็นแผลสีน้ำตาลกึ่งที่เป็นโรคยอดจะเหี่ยวใบเหลืองและร่วงเป็นหย่อม ๆ ต่อมากิ่งจะแห้งตาย การแพร่ระบาดโดยอาศัยลมและน้ำฝน และจะระบาดรุนแรงเมื่อมีความชื้นที่เหมาะสม

• แนวทางป้องกัน/แก้ไข

1. ตัดแต่งกิ่งให้เหมาะสมและมีทรงพุ่มโปร่งเพื่อให้ต้นได้รับแสงแดด และอากาศถ่ายเทได้ดีเป็นการลดความชื้นทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการระบาดของโรค
2. ในช่วงฤดูฝนหมั่นตรวจสอบแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอเมื่อพบอาการของโรคตัดกิ่งที่เป็นโรคนำไปทำลายนอกแปลงปลูกด้วยการเผาทิ้ง หรือ หากพบบนง่ามกิ่งหรือโคนกิ่งที่มีขนาดใหญ่ หรือบริเวณลำต้นให้ฉาบน้ำยาป้องกันที่เป็นโรคออก จากนั้นพ่นด้วยสารคอปเปอร์ออกไซด์ 85% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์เบนดาซิม 50% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ให้ทั่วต้น โดยเน้นบริเวณกิ่ง และลำต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณแผล ตามกิ่งก้านที่อยู่ในทรงพุ่มเสมอๆ